

TOS FERINA

VACUNÁNDOTE LE PROTEGES

La mejor forma de proteger al bebé
es la vacunación de su entorno
más cercano



¿QUIÉN DEBE VACUNARSE?

Debe vacunarse cualquier adolescente o adulto (abuelos, cuidadoras...) en contacto estrecho con el bebé.

- Padres*
- Abuelos
- Contactos domiciliarios
- Personal sanitario
- Cuidadores de guarderías

* Las autoridades sanitarias de varios países como Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Colombia, Costa Rica y Nueva Zelanda recomiendan la vacunación de las embarazadas en las últimas semanas de la gestación.

¿CUÁNDO VACUNARSE?

La vacunación de todos los futuros contactos domiciliarios de los lactantes menores de 6-12 meses debe realizarse, al menos, 2 semanas antes del nacimiento.

La vacunación frente a la tos ferina no afecta a la lactancia materna.

PREGUNTA A TU PEDIATRA.



**CONSULTA A TU MÉDICO SOBRE
LA VACUNACIÓN FRENTE A
DIFTERIA, TÉTANOS Y TOS FERINA**



REFERENCIA:

Campins M, et al. Tos ferina en España. Situación epidemiológica y estrategias de prevención y control. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Tos ferina. *Enferm Infecc Microbiol Clin*. 2013. <http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2012.12.011>.

